



ЗАО КОНСУЛ

ВАКЦИНА ПРОТИВ
АКТИНОБАЦИЛЛЯРНОЙ
ПЛЕВРОПНЕВМОНИИ
СВИНЕЙ
ИНАКТИВИРОВАННАЯ
ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ
ПЛЕВРОВАК-С



РЕГИСТРАЦИОННОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВАКЦИНА ПОЛУЧИЛА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА
23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА № 5941-10-17
БВБЖ



**ВАКЦИНА ПРОТИВ
АКТИНОБАЦИЛЛЯРНОЙ
ПЛЕВРОПНЕВМОНИИ СВИНЕЙ
ИНАКТИВИРОВАННАЯ
ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ
ПЛЕВРОВАК-С**

Описание: по внешнему виду вакцина представляет собой гомогенную эмульсию от серого до белого цвета, без механических включений, при хранении которой допускается расслоение с образованием осадка, при встряхивании которого образуется равномерная эмульсия.

Вакцину выпускают по 50, 100, 200, 400 см³ в стеклянных флаконах, закупоренных резиновыми пробками и обкатанных металлическими колпачками.

Состав: Анатоксины *Actinobacillus pleuropneumonia* (Арх I, Арх II, Арх III), мембранный ОМР-белок, инактивированные формалином в концентрации 0,4% и эмульгированные в масляном адъюванте.

Показания к применению: вакцина против актинобациллярной плевропневмонии свиней инактивированная эмульгированная предназначена для специфической профилактики актинобациллярной плевропневмонии свиней. Вакциной иммунизируют клинически здоровых животных. Слабых и больных особей вакцинируют только после соответствующего лечения их и выздоровления.

Способ применения и дозы: вакцина вводится животным внутримышечно с применением шприцев или специальных дозаторов. Вакцинацию проводят с соблюдением установленных правил асептики и антисептики. Место введения вакцины обрабатывают этиловым спиртом с объемной долей 70%.

Перед применением вакцины флакон с ней выдерживают в течении 30 мин при температуре плюс (35 ± 2) °С, встряхивают до образования гомогенной суспензии. Запрещается смешивать вакцину с другими препаратами.

Поросётам вакцину вводят двукратно с интервалом между первичным и повторным введением 1-4 недели, начиная с 25 дня жизни. Доза препарата 2,0 см³ на введение.

Схема вакцинации проверяемых и основных свиноматок: двукратно с интервалом между первичным и повторным введением 1-4 недели. Доза препарата 2,0 см³ на введение.

За вакцинированными животными ведут клиническое наблюдение в течение 7-10 суток.