



ЗАО КОНСУЛ

**ВАКЦИНА ПРОТИВ
СТРЕПТОКОККОЗА
СВИНЕЙ
ИНАКТИВИРОВАННАЯ
ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ
СТРЕПТОВАК-С**



РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**ВАКЦИНА ПОЛУЧИЛА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА
31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА**

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА № 5776-10-17
БВБЖ**



ВАКЦИНА ПРОТИВ СРЕПТОКОККОЗА СВИНЕЙ

ИНАКТИВИРОВАННАЯ

ЭМУЛЬГИРОВАННАЯ

СТРЕПТОВАК-С

Описание: по внешнему виду вакцина представляет собой гомогенную от серого до белого цвета эмульсию, без механических включений, при хранении которой допускается расслоение с образованием осадка, при встряхивании которого образуется равномерная эмульсия.

Вакцину выпускают по 50, 100, 200, 400 см³ в стеклянных флаконах, укупоренных резиновыми пробками и обкатанных металлическими колпачками.

Состав: вакцина содержит *Streptococcus suis* с М-белком, инактивированные формалином в концентрации 0,4% и эмульгированные в масляном адьюванте.

Показания к применению: вакцину применяют для вакцинации свиней с профилактической целью на свиноводческих объектах, стационарно неблагополучных и угрожаемых по стрептококкозу.

Вакциной иммунизируют клинически здоровых животных.

Вакцина вызывает выработку специфических антител у вакцинированных свиней против стрептококковой инфекции, вызываемых *Streptococcus suis*.

Иммунитет развивается через 14 дней после двукратного введения и сохраняется в течение последующих 6 месяцев

Слабых и больных особей вакцинируют только после соответствующего лечения их и выздоровления.

Способ применения и дозы: вакцина вводится животным внутримышечно с применением шприцев или специальных дозаторов. Место введения вакцины обрабатывают этиловым спиртом с объемной долей 70%.

Перед применением вакцины флакон с ней выдерживают в течении 30 мин. при температуре плюс (35 ± 2) °С, встряхивают до образования гомогенной суспензии. Вакцину вводят двукратно внутримышечно в дозе по 2 см³.

Вакцинацию свиноматок проводят двукратно с интервалом в 4 недели с учетом того, что вторая вакцинация должна быть проведена за 3-4 недели до предполагаемой даты опороса. Ревакцинация проводится однократно за 3-4 недели до предполагаемой даты каждого последующего опороса.

Вакцинацию поросят проводят двукратно с интервалом в 2-3 недели, начиная с 2-х недельного возраста.