

Рассмотрено и одобрено
Ветбиофармсоветом
Минсельхозпрода Республики Беларусь
Протокол № 88 от «23» декабря 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного препарата «Карно-Пиг»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Карно-Пиг (Karno-Pig).

1.2 В 1 мл препарата содержится 3,5 мг железа, 50 мкг меди, 1 мкг витамина В₁₂, 20 мкг фолиевой кислоты, 3,3 мг L-карнитина, 2,86 мг таурина, 250 мг глюкозы.

1.3 По внешнему виду препарат представляет собой сиропообразную коричнево-зеленую опалесцирующую жидкость (допускается небольшой осадок).

1.4 Препарат выпускают в полиэтиленовых флаконах по 150 мл; 150 мл с дозатором на 1,5 мл; 500 мл; 1000 мл.

1.5 Препарат хранят с предосторожностью (список Б) в оригинальной упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре от плюс 10°C до плюс 25°C.

1.6 Срок годности препарата – 24 месяца от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Механизм действия препарата обусловлен набором биологически активных веществ, входящих в его состав.

Микроэлементы и витамины (железо, медь, витамины В₁₂ и В_c) обеспечивают нормальный процесс кроветворения.

Карнитин обуславливает возможность использования сердечной мышцей и скелетными мышцами жирных кислот для энергетических потребностей, улучшает кровообращение и усиливает работоспособность мышц, участвует в терморегуляции, обеспечивая изотермию в организме животных, противодействует ожирению печени, положительно влияет на метаболизм, усиливая усвояемость азота в организме.

Таурин (аминокислота) усиливает действие карнитина, предупреждает повреждение сетчатки глаза, иммунологические нарушения, кардиомиопатию, расстройства нервной системы, увеличивает секрецию желчи, тем самым повышает эмульгируемость жиров и их усвоение.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Препарат «Карно-Пиг» применяется поросятам для профилактики и лечения при анемии, токсической дистрофии печени, для повышения жизнеспособности, при стрессах (отъем, транспортировка, вакцинации).

3.2 Препарат применяют внутрь с питьевой водой групповым методом (слабым поросятам и поросятам с расстройствами желудочно-кишечного тракта препарат применяют индивидуально) в следующих дозах:

- поросята-сосуны – 3 мл препарата на животное один раз в день в течение 5-10 дней;
- поросята-отъемыши – 5-7 мл препарата на животное один раз в день в течение 5 дней до и 5 дней после отъема.

3.3 Противопоказания не установлены.

3.4 Побочные действия не отмечены.

3.5 Мясо, полученное от животных, которым применяли препарат, используется в пищу без ограничений.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными средствами.

4.2 Лицам, проявляющим повышенную чувствительность к компонентам препарата, следует избегать прямого контакта с препаратом.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЬЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарным специалистам этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИВОДИТЕЛЯ

6.1 Ветокинол Биовет Сп.с.о.о, 66-400 Гожув Влкп., ул. Косынерув Гдыньских, 13-14.

Инструкция подготовлена сотрудником УО ВГАВМ Вербицким А.А. и специалистом ЗАО «Консул» Александровым В.М. на основании досье на препарат.

