

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
Комитета ветеринарного контроля
и надзора МСХ РК



[Handwritten signature]

06 _____ 2016 г.

НАСТАВЛЕНИЕ
по применению ветеринарного препарата Эндуро
Премикс (Enduro Premix) для лечения и
профилактики энтеритов бактериальной этиологии

Держатель подлинника:

Zhejiang Dayang Biotech Group Co.,Ltd
TEL: 86-571-87608852
FAX: 86-571-87608839



2016 год
sales@sharepharm.com

Глава 1. Общие сведения

1.1. Торговое наименование: Эндуро Премикс (Enduro Premix)

Международное непатентованное наименование: Энрамицин 8% препарат для лечения или профилактики энтеритов бактериальной этиологии (с целью увеличения привесов и улучшения конверсии корма) у домашней птицы, свиней и рыбы. Для введения в комбикорм.

1.2. Лекарственная форма: микрогранулы.

Эндуро Премикс в качестве действующего вещества в 1кг содержит высушенную ферментационную массу энрамицина с активностью 80 г по энрамицину моногидрату, а также вспомогательный компонент: порошок из рисовых отрубей - до 1кг.

1.3. Препарат выпускают расфасованным в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, массой нетто 25 кг и снабжают наставлением по применению на русском и казахском языках.

Перед применением необходимо прочитать наставление по применению.

1.4. По внешнему виду препарат представляет собой сероватый или светло-желтый порошок, с характерным запахом.

1.5. Эндуро Премикс транспортируют и хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше +25°C и относительной влажности не более 85% в закрытой упаковке, отдельно от продуктов питания и кормов.

Препарат может транспортироваться всеми видами транспорта, включая авиационный транспорт.

1.6. Эндуро Премикс хранят в местах, недоступных для детей.

1.7. Срок годности препарата 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортировки. По истечении срока годности препарат к применению не пригоден.

1.8. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Глава 2. Порядок применения ветеринарного препарата

2.1. Эндуро Премикс (Enduro Premix) – относят к антибактериальным средствам группы полипептидов.

Его активный компонент Энрамицин действует как необратимый ингибитор фермента, MurG, необходимого для катализа реакции трансгликирования на последней стадии синтеза пептидогликана, оказывая мощное бактерицидное и бактериолитическое действие на стенку грамположительных бактерий. Данная особенность обуславливает отсутствие возможности у *Clostridium perfringens* выработать резистентность к Энрамицину.

2.2. Большая молярная масса молекулы Энрамицина -2355,30 г/моль препятствует её прохождению сквозь стенку кишечника и проникновению в кровяное русло. Это сводит к нулю вероятность попадания остаточных количеств препарата от животных, получавших Эндуро Премикс, в пищу для человека. Препарат в неизменном виде выводится из кишечника.

2.3. Препарат характеризуется значительным антибактериальным эффектом в аэробных и анаэробных условиях в отношении большинства грамположительных бактерий и направленным действием, прежде всего, в

отношении *Clostridium perfringens*, вызывающих некротический энтерит и подавление роста у домашней птицы.

2.4. Перекрестная резистентность между энрамицином и другими имеющимися антибиотиками или антибактериальными препаратами не зарегистрирована. Резистентность к Эндуро Премикс развивается очень медленно. *Clostridium perfringens*, устойчивых к энрамицину, не выделено.

2.5. Продукт сохраняет длительную стабильность в процессе гранулирования и в корме.

2.6. Эндуро Премикс действует во всех отделах кишечника и способствует поддержанию баланса кишечной флоры. Подавляет микроорганизмы, производящие азотосодержащие соединения, такие как аммиак, тем самым снижая уровни аммиака в содержимом кишечника и крови.

Эндуро Премикс снижает потерю массы поросят в период доращивания и откорма что позволяет добиться повышения показателей набора массы у поросят, а также повысить эффективность усвоения корма.

2.7 Эндуро Премикс применяется только в составе комбикормов:

Птице:

- для улучшения показателей выращивания и увеличения среднесуточных приростов, снижения конверсии корма;
- для снижения падежа, вызванного грамположительными и грамотрицательными бактериями, обитающими в желудочно-кишечном тракте;
- для снижения влажности подстилки;
- для уменьшения содержания аммиака в помете/навозе.

Свиньям:

- для улучшения показателей выращивания и увеличения среднесуточных приростов, снижения конверсии корма в период доращивания и откорма;
- для снижения падежа у поросят на доращивании, свиней на откорме и свиноматок, вызванного грамположительными и грамотрицательными бактериями, обитающими в кишечнике в том числе: *Clostridium perfringens*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, а также для профилактики синдрома мгновенной смерти свиноматок и свиней на откорме;
- для лечения и профилактики кровавых диарей, вызванных *Clostridium perfringens* у свиней на доращивании и откорме;
- для уменьшения содержания аммиака в помете/навозе.

Рыбам:

- для улучшения показателей выращивания и увеличения среднесуточных приростов, снижения конверсии корма;
- для снижения падежа, вызванного грамположительными и грамотрицательными бактериями, обитающими в кишечнике у рыб.

Нормы ввода в комбикорма:

Эндуро Премикс (Enduro Premix) - вводится в готовый комбикорм только через премикс, в следующих концентрациях:

Для птицы (включая индейку)

Бройлеры (рацион предстартер, стартер, гровер, финишер) – 150 г/т корма
Несушки (до 8 недель и старше 8 недель) - 150 г/т корма

Для свиней:

Поросята (рацион на дорастивании и откорме)	- 200 г/т корма
Супоросные свиноматки	- 300 г/т корма
Лактирующие свиноматки	- 300 г/т корма

Для рыб:

Рыбы	- 80 г/т корма.
------	-----------------

2.8. Эндуро Премикс не оказывает тератогенного (нарушение эмбрионального развития) воздействия на супоросных свиноматок, на сперматогенез хряков, петухов, на репродуктивную систему несушек.

Побочных явлений и осложнений при применении Эндуро Премикс при применении в соответствии с данным Наставлением по применению, как правило не наблюдается.

2.9. Эндуро Премикс без ограничения можно совмещать с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками, используемые в комбикормах (за исключением акромицина, китасамицина и виржиниамицина).

3.0. Убой птицы, свиней на мясо разрешается без ограничений. Эндуро Премикс не всасывается в кровяное русло, не накапливается в мясе свиней и птицы.

Сроки ожидания по мясу- 0 дней

Сроки ожидания по яйцу- 0 дней

Меры личной профилактики:

При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности. Во время работы с препаратом запрещается принимать пищу, пить воду, курить.

После окончания работы руки и лицо следует тщательно вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

Лицам, проявляющим чувствительность к энрамицину, следует избегать прямого контакта с препаратом.

Порядок предъявления рекламаций:

В случае появления осложнений, применение препарата данной серии прекращают, и обращаются к изготовителю: «Zhejiang Dayang Biotech Group Co.,Ltd » Китай (22 Chaoyang Road, Dayang town, Jiande City, провинция Zhejiang 318000).