

Рассмотрено и одобрено
Ветбиофармсоветом Минсельхозпрода
Республики Беларусь.
Протокол № 73 от «11» июля 2014г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ветеринарного препарата «Суибикол порошок».

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Суибикол порошок (Suibicolum Pulvis).
- 1.2 По внешнему виду препарат представляет собой однородный порошок бежевого цвета с фруктовым ароматом.
- 1.3 В 1 кг препарата содержится 300 г цинка оксида и 200 г сульфагуанидин моногидрата.
- 1.4 Препарат выпускают расфасованным по 1 кг в полиэтиленовых мешках и по 10 кг в бумажных. Хранят с предосторожностью (список Б) в защищенном от света месте при температуре от плюс 15⁰С до плюс 25⁰С. Срок годности 2 года со дня изготовления.
- 1.5 Препарат не теряет своей активности при кратковременном воздействии температуры (плюс 80⁰С в течение 15 мин.), что позволяет готовить гранулированный лекарственный комбикорм.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Цинка оксид обладает вяжущим, адсорбирующим, противомикробным и противовоспалительным действием. Небольшая часть цинка оксида в кислой среде желудка превращается в хлорид цинка и виде иона цинка всасывается в кровь, восполняя тем самым дефицит цинка.
Сульфагуанидин относится к сульфаниламидам местного действия. Обладает высокой антимикробной активностью в отношении грамотрицательных патогенных микроорганизмов кишечной группы, некоторых грамположительных микроорганизмов и эймерий в т. ч., *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Streptococcus* spp., *Staphylococcus aureus*, *Eimeria* spp. Оказывает бактериостатическое действие. Механизм антимикробного действия сульфагуанидина связан с блокированием фермента дигидроптероатсинтетазы и конкурентным антагонизмом с парааминобензойной кислотой (ПАБК).
- 2.2 Часть цинка из состава препарата поглощается организмом, другая часть – выводится в основном с фекалиями и частично с мочой.
Сульфагуанидин плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта, максимальная концентрация в крови достигается через 2-4 часа. До 50% введенной дозы выводится с мочой, остальная его часть в неизменном виде выводится из организма с фекалиями.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

- 3.1 Суибикол применяют поросятам для профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами.
- 3.2 Препарат поросятам применяют орально в смеси с комбикормом из расчета 1 кг на 100 кг корма в течение 10-14 дней. Для приготовления смеси препарат вначале смешивают с небольшим количеством корма, а затем с остальной частью корма.

- 3.3 Противопоказания. Не превышать рекомендуемые сроки применения препарата. Не применять вместе с тетрациклинами - цинк может ограничить их всасывание. Нельзя одновременно применять фолиевую кислоту. Препарат противопоказан животным при заболеваниях системы крови, при заболеваниях печени, почек, мочекаменной болезни и повышенной чувствительности к сульфаниламидам.
- 3.4 Побочные действия. Нарушение функции почек, вызванное осаждением сульфаниламида в почечных канальцах, торможение синтеза витамина К1 в пищеварительном тракте.
- 3.5 Убой животных на мясо допускается не ранее, чем через 10 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

- 4.1 При работе с ветеринарным препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

- 5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарным специалистам этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (г. Минск, ул. Красная 19А) для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИВОДИТЕЛЯ

- 6.1 ВЕТОКИНОЛ Биовет Сп.з.о.о.,
66-400 Гожув Влп., ул. Косинеров Гдынских, 13-14, Польша
тел. +48957285500, факс +48957359043

Инструкция подготовлена специалистом ЗАО «Консул» Александровым В.М. на основании досье на препарат.

