

Инструкция рассмотрена и одобрена
на заседании Ветбюфармсовета
Минсельхозпрода РБ
Протокол № 87 от 18.11.2016г.

Инструкция
по применению препарата ветеринарного
Феррум 10%+В₁₂

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Феррум 10%+В₁₂ (Fepum 10%+В₁₂)
- 1.2. Препарат представляет собой слегка вязкую жидкость для инъекций темно-коричневого цвета.
- 1.3. В 1 см³ препарата содержится: 100 мг железа в форме железа (III)-декстран комплекс, 1,5 мкг витамина В₁₂ (цианокобаламин).
- 1.4. Препарат выпускают по 100 см³ в стеклянных флаконах типа 1USP с резиновой пробкой и алюминиевым колпачком.
- 1.5. Препарат хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре от плюс 15°С до плюс 25°С.
- 1.6. Срок годности препарата – 2 года со дня изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1. Железо – микроэлемент, стимулирующий эритропоэз. Железо играет важную роль в ходе многих биохимических реакций. Оно является компонентом гемоглобина, миоглобина, а также входит в состав некоторых ферментов (цитохромы, каталазы, пероксидазы). Недостаток железа в организме приводит к снижению содержания гемоглобина (гипохромная анемия).
- 2.2. Витамин В₁₂ оказывает положительное действие на процессы кроветворения, стимулирует образование холина, нуклеиновых кислот и ресинтез метионина в организме животных, благоприятно действует на функцию печени и нервной системы.
- 2.3. Препарат характеризуется низкой вязкостью и быстро всасывается из места инъекции.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

- 3.1. Препарат Феррум 10%+В₁₂ применяется для профилактики и лечения железодефицитной анемии у животных.
- 3.2. Препарат применяют однократно внутримышечно молодняку на 3-5 день жизни, взрослым животным – по показаниям в следующих дозах:

- поросятам:	1-2 см ³
- телятам, жеребятam:	3-6 см ³
- овцам, козам:	2-3 см ³
- КРС, лошадям:	4-8 см ³
- кошкам, собакам:	0,5-2 см ³
- 3.3. Побочное действие. При применении по показаниям в рекомендуемых дозах побочное действие не установлено.
- 3.4. Противопоказания. Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата; обработка животных в течение десяти последних дней другими препаратами, содержащими железо; животным с диареей.

3.5. Сроки ожидания. Продукцию животноводства после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1. При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и технику безопасности при работе с ветеринарными препаратами.

4.2. После применения препарата животным необходимо руки и лицо вымыть теплой водой.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ


5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение "Белорусский государственный ветеринарный центр" (г. Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения на соответствие требованиям нормативных документов.

6. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1. "Бремер Фарма ГмбХ" (Bremer Pharma GmbH), Werkstr. 42, 34414 Warburg, Германия.

Инструкция подготовлена менеджером фирмы "Бремер Фарма ГмбХ" г-ном Клаусом Мангелсом.

Ветбиофармсовет при Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора МСХиП РБ	
ОДОБРЕНО	
Председатель	
Секретарь	
Эксперт	
18.11.2016 г. протокол № 87	