

Зем. Председатель Комитета ветеринарного
контроля и надзора Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан

06
 06

по ветеринарному применению лекарственного препарата FORTINMUNE BOV для стимулирования неспецифического иммунного ответа для уменьшения симптомов мастита, вызванных *Staphylococcus aureus* и уменьшения количество соматических клеток

(Организация – производитель: LABORATORIOS OVEJERO S.A.
Ctra. León - Vilecha No 30 24192 - León (Spain) tel.: +34 902 23 57 00 fax: +34
987 20 53 20 e-mail: ovejero@labovejero.es)

1. Торговое наименование – FORTINMUNE BOV (ФОРТИНМУНЕ БОВ)

2. Лекарственная форма – инъекционная суспензия

Форма выпуска: Коробка с флаконом 50 мл (10 доз) Коробка с флаконом 100 мл (20 доз)

Срок годности препарата 36 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. Срок годности после первого вскрытия первичной упаковки: 10 часов.

5. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Флаконы с препаратом без этикеток, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией содержимого, с наличием посторонних примесей, а также остатки препарата, не использованные в течение 10 часов после вскрытия флаконов, подлежат выбраковке.

ГЛАВА II. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА

7. Фармакотерапевтическая группа: другие иммуностимуляторы. Код АТСvet: QL03AX.

8. Препарат предназначен для стимулирования неспецифического иммунного ответа, для уменьшения симптомов мастита, вызванных *Staphylococcus aureus* и уменьшение SCC (количество соматических клеток). Стимулирующий эффект появляется через 4 часа с момента применения препарата. Повышает качество молозива и уменьшает пуэрперальные инфекции. Профилактика аборт, вызванных *Neospora caninum* у молочного скота. Укрепляет иммунную реакцию антител в вакцинации телят вакцинами IBR и BVD. Повышение эффективности искусственного осеменения коров. В качестве заменителя в лечении инфекций *Fasciola hepatica* у овец и коров.

9. Дозы и способ приема

Способ приема: внутримышечно

Подать одну дозу и повторить через 15 дней.

Крупный рогатый скот: Дозировка: 5 мл на животное

Минимальный рекомендуемый возраст для введения: коровы во время первой лактации.

В качестве заменителя в лечении инфекций *Fasciola hepatica*: крупный рогатый скот и овцы: 2 мл на животное.

10. Препарат может применяться в период беременности и лактации.

11. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений не отмечается.

12. Продукты убоя реализуют без ограничения независимо от сроков введения препарата.

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

На рабочем месте запрещается принимать пищу, пить и курить. В местах работы должна быть аптечка доврачебной помощи.

14. При случайном попадании препарата на кожу и/или слизистые оболочки, их рекомендуется промыть большим количеством чистой воды.

15. Любые неиспользованные ветеринарные лекарственные препараты или отходы, полученные от таких ветеринарных лекарственных препаратов следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.

Наименования и адреса	LABORATORIOS OVEJERO S.A.
производственных площадок	Ctra. León - Vilecha No 30 24192 - León
производителя лекарственного	(Spain) tel.: +34 902 23 57 00 fax: +34
препарата для ветеринарного	987 20 53 20 e-mail:
применения	ovejero@labovejero.es