

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

10.10.2022

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата НКП (НКР)
(организация-разработчик: ООО «ВЕТФАРМСТАНДАРТ», 117447,
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 35, стр. 1, этаж 2, комната 21)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-22.22-4934 ПБВР-3.22.22/03765

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: НКП (НКР)
Международное непатентованное наименование: мультиомицин, китасамицин.
2. Лекарственная форма: порошок для приема внутрь.
НКП в качестве действующего вещества в 1 кг содержит высушенную ферментационную массу с активностью 10 г мультиомицина и китасамицина тартрат - 50 г, а также вспомогательный компонент: порошок из рисовых отрубей - до 1 кг.
3. По внешнему виду препарат представляет собой микрогранулированный порошок от светло-желтого до желтого цвета, с характерным запахом.
Срок годности НКП при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года с даты производства.
Запрещается применение НКП по истечении срока годности.
4. Лекарственный препарат выпускают расфасованным по 10 кг и 25 кг в мешки из многослойной бумаги с пластиковым покрытием с полиэтиленовым вкладышем соответствующей вместимости. Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.
5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре не выше 25 °С.
6. НКП необходимо хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Лекарственный препарат относится к антибактериальным средствам из группы макролидов в комбинациях.

Мультиомицин, входящий в состав препарата, является бициклическим тиопептидом оказывающим бактерицидное действие, заключающееся в нарушении синтеза белка в клетках грамположительных бактерий, что приводит к их гибели.

Китасамицин - антибиотик из группы макролидов активен в отношении как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий. Механизм его антибактериального действия заключается в способности обратимо связываться с 50S субъединицей рибосомы в ее донорской части, что приводит к блокаде синтеза белков за счет нарушения процесса транслкации и образования пептидных связей между молекулами аминокислот. Отмечено повышение активности Китасамицина при щелочных значениях pH.

Препарат характеризуется значительным антибактериальным эффектом в аэробных и анаэробных условиях в отношении большинства грамположительных бактерий включая *Staphylococcus* spp, *Streptococcus* spp, *Diplococcus* spp, *Listeria* spp, *Corynebacterium* spp и направленным действием, прежде всего, в отношении *Clostridium perfringens* и *Clostridium difficile*, вызывающих некротический энтерит и подавление роста у домашней птицы. НКП эффективен, в отношении бактерий рода *Salmonella* и *Mycoplasma*.

Перекрестная резистентность между НКП и другими имеющимися антибиотиками или антибактериальными препаратами не зарегистрирована. Бактерий рода *Clostridium* spp. и *Staphylococcus* spp. (включая MRSA), устойчивых к данному препарату, не выделено.

НКП после орального применения в незначительной степени всасывается в кровяное русло, практически не накапливаясь в органах и тканях, выводится из организма с фекалиями. НКП действует во всех отделах кишечника, способствует поддержанию баланса кишечной флоры, тем самым оказывая регулирующее действие на состав микробиоты кишечника, что позволяет снизить фекальные потери питательных веществ организмом животных и птицы. Подавляя микроорганизмы, производящие азотосодержащие соединения, такие как аммиак, НКП снижает уровни аммиака в содержимом кишечника и крови. Препарат уменьшает количество помёта и выделение аммиака, что позволяет сохранять подстилку сухой, снижая количество пододерматитов и аммиачных ожогов кожи лап и тушки у птиц, улучшая товарный вид тушки, повышая гигиену в животноводческих помещениях и снижая загрязнение окружающей среды.

10. НКП по степени воздействия на организм относится к мало опасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Лекарственный препарат НКП применяют сельскохозяйственной птице и свиньям для лечения некротического энтерита, синдрома мальабсорбции, а также с лечебно-профилактической целью сельскохозяйственной птице при пододерматитах, энтероколитах и дисбиозах вызванных неконтролируемым ростом патогенной микрофлоры кишечника.

12. Запрещается применять лекарственный препарат животным при повышенной индивидуальной чувствительности к полипептидам и макролидам, а также при тяжелых заболеваниях печени и почек.

13. При проведении лечебных мероприятий с использованием препарата следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами, использовать средства индивидуальной защиты: защитную маску или респиратор, защитные очки, перчатки. После применения препарата необходимо вымыть руки с мылом.

Людям с повышенной чувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Пустая упаковка из-под препарата подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его тотчас необходимо смыть струей воды, при попадании внутрь - обратиться к врачу. При себе иметь инструкцию по применению или этикетку.

14. Препарат можно применять беременным и лактирующим свиноматкам, а также цыплятам с 1-го дня жизни. Препарат не рекомендуется использовать в период яйцекладки у кур-несушек.

15. НКП вводят в комбикорма или кормосмеси на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания, а также путем ввода через витаминно-минеральный премикс или белково-витаминно-минеральный концентрат. НКП применяется только в составе комбикормов. Комбикорма с введенным НКП не должны подвергаться температурному воздействию выше 90 °С.

Для лечения некротического энтерита и синдрома мальабсорбции НКП применяют в дозах:

Цыплята бройлеры (рационы - предстартер; стартер; гроуэр; 1-й финишер) – 300-350 г/т корма.

Индейки (рационы-предстартер; стартер; гроуэр; 1-й финишер) – 350 г/т корма.

Утки (рационы - предстартер; стартер; гроуэр; 1-й финишер) – 300 г/т корма.

Поросята (рационы – СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5) – 350-1000 г/т корма.

Продолжительность применения с лечебно-профилактической целью сельскохозяйственной птице против некротического энтерита, синдрома мальабсорбции, дисбиозов и энтероколитов - до 14 суток.

Продолжительность применения с лечебно-профилактической целью свиньям против некротического энтерита, энтероколита, илеита и дисбиозов - до 14 суток.

Для лечения острой геморрагической формы некротического энтерита, сальмонеллёза и микоплазмоза птиц и свиней доза, применяемая с лечебно-профилактической целью, удваивается и применяется в течение 7 суток, но при этом не менее чем до полного исчезновения симптомов заболевания, во избежание формирования антибиотико-резистентной микрофлоры.

16. Побочных явлений и осложнений при применении НКП в соответствии с данной инструкцией по применению, как правило не наблюдается.

17. Симптомы передозировки не выявлены.

18. Возможно одновременное применение НКП с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками, используемыми в комбикормах.

19. Особенности действия НКП при первом приеме или при его отмене не установлено.

20. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае

пропуска одной дозы необходимо возобновить применение препарата в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой свиней и сельскохозяйственной птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 3 суток после последнего применения препарата НКП. В случае вынужденного убоя свиней и сельскохозяйственной птицы ранее установленного срока мясо можно использовать в корм пушным зверям.

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

«Zhejiang Dayang Biotech Group Co.,
LTD», 22, Zhaoyang Road, Dayang Town,
Jiande City, Zhejiang Province, Китай

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий
от потребителя.

ООО «ВЕТФАРМСТАНДАРТ», 117447,
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 35,
стр. 1, этаж 2, комната 21.

Генеральный директор
ООО «ВЕТФАРМСТАНДАРТ»



А.О. Темников