

ИНСТРУКЦИЯ

по применению кормовой добавки Актисаф Sc 47 Std для оптимизации процессов пищеварения, повышения сохранности и увеличения привесов сельскохозяйственных животных и птицы.

(организация-производитель фирма "S.I. Lesaffre"/ "С.И. Лесафр", Франция)

I. Общие сведения

1. Актисаф Sc 47 Std (Actisaf Sc 47 Std) – добавка кормовая для оптимизации процессов пищеварения, повышения сохранности и увеличения привесов сельскохозяйственных животных и птицы.

2. Актисаф Sc 47 Std представляет собой высушенную культуру живых дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* (штамм NCYC Sc 47). В 1 г Актисаф Sc 47 Std содержится не менее $1,0 \times 10^{10}$ КОЕ (колониеобразующих единиц) *Saccharomyces cerevisiae*.

Актисаф Sc 47 Std не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов. Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, принятых в Российской Федерации.

3. По внешнему виду Актисаф Sc 47 Std представляет собой гранулы бежевого цвета со слабым запахом дрожжей.

4. Актисаф Sc 47 Std выпускают расфасованным по 25 кг в полиэтиленовых мешках. Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой с указанием на русском языке: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, массы нетто, срока и условий хранения, даты изготовления, номера партии, информации о подтверждении соответствия, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

5. Актисаф Sc 47 Std хранят в упаковке производителя, в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей хорошо проветриваемом помещении, при температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 75%.

Срок годности при соблюдении условий хранения – 24 месяца со дня изготовления. Актисаф Sc 47 Std запрещается использовать по истечении срока годности.

II. Биологические свойства

6. Дрожжи стимулируют в кишечнике рост полезной микрофлоры и активизируют процессы пищеварения, и тем самым способствует более полному извлечению питательных веществ из корма у животных и благоприятно влияют на обмен веществ в организме. Актисаф Sc 47 Std повышает сохранность животных, их продуктивность, предотвращает возникновение у животных диареи, а у жвачных животных развитие ацидоза в рубце.

III. Порядок применения

7. Актисаф Sc 47 Std предназначен для оптимизации процессов пищеварения, повышения сохранности, увеличения привесов и повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы.

8. Актисаф Sc 47 Std применяют индивидуально или групповым методом в составе премиксов, комбикормов, кормовых смесей, минерально-витаминных добавок, заменителей цельного молока. При внесении Актисаф Sc 47 Std в комбикорма, концентраты, витаминно-минеральные добавки и заменители молока на комбикормовых, премиксных заводах или в кормоцехах хозяйств используют соответствующие технологии смешивания и оборудование, обеспечивающее равномерное смешивание кормовой добавки с комбикормом.

Норма ввода из расчёта на тонну корма:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Свиноматкам | 250-1000 г/т корма |
| Свиньям | 125-1000 г/т корма |
| Кроликам | 250-1000 г/т корма |
| Курам-несушкам | 250-2000 г/т корма |
| Бройлерам | 250-2000 г/т корма |
| Поросятам | 250-1000 г/т корма |
| Телятам на откорме (0-4 мес.) | 250-1000 г/т корма |

Норма ввода индивидуально, г/голову:

| | |
|--|---------------------|
| Крупный рогатый скот мясных пород на откорме | 2-6 г/день/голову |
| Коровы, молочных пород | 2-8 г/день/голову |
| Бараны, козы, овцы | 0,5-2 г/день/голову |
| Лошади | 4-10 г/день/голову |

Актисаф Sc 47 Std рекомендуется применять на протяжении всего продуктивного периода животных и птицы.

9. Побочных явлений и осложнений при применении Актисаф Sc 47 Std в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний к применению не установлено.

10. Актисаф Sc 47 Std совместим со всеми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.

11. Противопоказаний к применению не установлено.

12. Продукцию животноводства и птицеводства после применения Актисаф Sc 47 Std можно использовать в пищевых целях без ограничения.

IV. Меры личной профилактики

13. При работе с кормовой добавкой Актисаф Sc 47 Std следует соблюдать общие правила личной гигиены и технику безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками для животных.

14. Актисаф Sc 47 Std следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО «САФ-НЕВА» (Московская обл., г. Химки) совместно с компанией «S.I. Lesaffre» Франция.

Адрес организации-производителя: «S.I. Lesaffre»/ «С.И. Лесаффр» (Франция), 137, rue Gabriel Peri, 59703, Marcq en Baroeul, France.

С утверждением данной инструкции теряет силу инструкция, утверждённая Россельхознадзором 14 августа 2012 г.

Рекомендовано к регистрации в Росениской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ГИСИ-2-8.8/8-2675