

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению НЕУБАЛАКА сухого  
для повышения молочной продуктивности коров

(организация-производитель компания «Brenntag Polska Sp. z o.o.» /  
«Бренntag Польша Сп.з.о.о.», Польша)

**I. Общие сведения**

1. НЕУБАЛАК сухой (NEUBALAC DRY) - добавка кормовая для повышения молочной продуктивности коров.

2. Кормовая добавка содержит: 1,2-пропандиол (пропилен-гликоль) - не менее 67,0 % и наполнитель диоксид кремния - до 100%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. По внешнему виду представляет собой порошок белого цвета, плохо растворимый в воде.

4. Выпускают добавку расфасованной по 25 кг в бумажные многослойные мешки с полиэтиленовым вкладышем.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака; названия кормовой добавки, назначения и способа применения; состава и гарантируемых показателей; массы нетто, номера партии; срока и условий хранения; даты производства; информации о подтверждении соответствия, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят добавку в упаковке организации-производителя, в сухом, хорошо вентилируемом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении, при температуре от минус 10 °С до 30 °С.

Срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.

Не использовать по истечении срока хранения.

**II. Биологические свойства**

5. Биологические свойства кормовой добавки НЕУБАЛАК сухой обусловлены входящими в состав компонентами. 1,2-пропандиол абсорбируется в рубце и преобразуется через глюконеогенез в глюкозу, которая обеспечивает

организм коров, особенно в период лактации, дополнительной энергией, способствующей повышению молочной продуктивности.

### III. Порядок применения

6. НЕУБАЛАК сухой применяют для повышения молочной продуктивности коров, особенно в период лактации, восполнения недостатка энергии в рационе.

7. Вводят добавку коровам индивидуально, в смеси с основным кормом в дозах:

- за 10 дней до отёла - 250 г/день/гол;

- через 3-4 недели после отёла - 250-400 г/день/гол.

8. При применении НЕУБАЛАКА сухого в соответствии с инструкцией по применению побочных явлений и осложнений не выявлено.

9. Противопоказаний к применению не установлено.

10. Добавка совместима с любыми ингредиентами корма, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

11. Молоко и мясо коров после применения НЕУБАЛАКА сухого используют в пищевых целях без ограничений.

### IV. Меры личной профилактики

12. При работе с НЕУБАЛАКОМ сухим необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, применяемыми при работе с кормовыми добавками.

13. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО «БРЕННТАГ» (г. Москва) совместно с организацией производителем «Бренntag Польша Сп.з.о.о.» (Польша).

Адрес организации-производителя: «Brenntag Polska Sp. z o.o.», ul. J. Bema 21, 47-224 Kedzierzyn- Kozle. Poland.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 17 декабря 2009 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-10.9/02993