



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Тойоцерина 10⁹ для нормализации процессов
пищеварения у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц

(организация-производитель: компания «Kaesler Nutrition GmbH»/
«Кеслер Нутришн ГмбХ», Германия)

I. Общие сведения

1. Тойоцерин 10⁹ (Тоуосерин 10⁹) - кормовая добавка для нормализации процессов пищеварения у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

2. Тойоцерин 10⁹ содержит в качестве действующего вещества живые споры штамма *Bacillus cereus* вариант *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) не менее 1×10⁹ КОЕ/г, а также вспомогательные вещества: кремниевую кислоту, карбонат кальция.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. По внешнему виду представляет собой порошок белого цвета, плохо растворимый в воде.

4. Тойоцерин 10⁹ выпускают расфасованным по 25 кг в бумажные мешки с внутренним полипропиленовым вкладышем.

Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, ее состава и гарантированных показателей, даты изготовления, номера партии, массы нетто, срока и условий хранения, информации о соответствии, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке организации-производителя в сухом, защищенном от света, хорошо вентилируемом помещении, при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления.

Не использовать по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Биологические свойства добавки обусловлены способностью спор *Bacillus cereus*, быстро развиваться и поддерживать естественную микрофлору в кишечнике животных и птицы, тем самым препятствуя росту и развитию патогенных микроорганизмов. Это способствует установлению и стабилизации микрофлоры кишечника и нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта.

6. Применение добавки повышает переваримость и усвояемость кормов, способствует высоким темпам роста и развития сельскохозяйственных животных.

III. Порядок применения

7. Тойоцерин 10⁹ применяют для нормализации процессов пищеварения сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

8. Добавку вводят в готовые комбикорма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. Допустимо введение



Тойоцерина 10⁹ в комбикорма с последующей грануляцией и экспандированием, при температуре не выше 85 °С.

Нормы ввода:

- поросята (до 2-х месяцев) - 1,0 кг/т;
- поросята (от 2-х до 4 месяцев) - 0,5 - 1,0 кг/т;
- свиньи на откорме - 0,2 - 1,0 кг/т;
- свиноматки - 0,5 - 2,0 кг/т;
- цыплята-бройлеры - 0,2 - 1,0 кг/т;
- индейки - 0,2 - 1,0 кг/т.

9. Тойоцерин 10⁹ совместим со всеми ингредиентами комбикормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

10. Побочных явлений и осложнений при использовании кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

11. Противопоказаний к применению не установлено.

12. Продукцию от сельскохозяйственных животных и птицы после применения кормовой добавки Тойоцерин 10⁹ можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

13. При работе с кормовой добавкой Тойоцерин 10⁹ необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

14. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана компанией «Kaesler Nutrition GmbH», Германия.

Адрес организации - производителя: «Kaesler Nutrition GmbH», Zeppelinstrasse 3, 27472 Cuxhaven, Германия.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Тойоцерина 10⁹, утвержденная заместителем Руководителя Россельхознадзора 19 апреля 2016 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВИ-2-4.6/02002



КОПИЯ ВЕРНА